

ESCUELAS PÚBLICAS DE VANCOUVER


MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA

Ningún medicamento podrá ser administrado por el personal del distrito escolar sin el permiso por escrito de un profesional médico que recetó el medicamento y del padre de familia/tutor.

SEGURO MÉDICO

Los estudiantes que no tengan seguro médico puede que califiquen para participar en el programa auspiciado por el estado llamado " *Washington State Health Plan*", incluso cuando sus padres tengan empleo. Llame al teléfono 1-877-543-7669. La Clínica Gratuita del Suroeste de WA (313-1390) provee asistencia médica para enfermedades agudas menores y vacunas para los niños y adultos sin seguro médico.

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la enfermera de la escuela.



*Los niños enfermos
deberían quedarse en casa.
Los niños sanos deberían
venir a la escuela.*

**¿DEBERÍA
ENVIAR
A MI
NIÑO
HOY A
LA ESCUELA?**

GUÍA

Escuelas Públicas de Vancouver

Quando dejar a su niño enfermo en casa...

Uno de los problemas que más confrontan los padres con niños de edad escolar ocurre cuando el niño se queja de que no se siente bien en un día de clases. Lo que se expresa a continuación no debería tomarse como consejo médico, pero ha sido diseñado simplemente como una guía a seguir hasta que usted contacte a su proveedor de servicios médicos.

En términos generales, el niño debería quedarse en casa si presentan alguna de las siguientes condiciones (tenga presente que el hecho de que no tenga fiebre no siempre es un indicativo de que el niño está suficientemente sano para asistir a la escuela):

- Fiebre de más de 100 grados en las últimas 48 horas.
Vómito- en las últimas 48 horas
Diarrea- en las últimas 48 horas
Sarpullido en la piel que no ha sido diagnosticado
Una enfermedad contagiosa
Piojos
- Dolor de garganta persistente y pérdida de la voz, dificultad para tragar y/o sarpullido.
Dolor de cabeza severo, dolor de muela, o dolor de oídos.
Cuello rígido o dolor de cabeza con fiebre o dolor de cabeza con fiebre
Infecciones de la piel
Dolor abdominal con fiebre baja.
Si le duelen los ojos, los tiene rojos y enmarañados (pegajosos)

DOLOR DE ESTÓMAGO

Llame a su proveedor de servicios médicos si su niño tiene dolor de estómago persistente o suficientemente fuerte que limita sus actividades.

DIARREA, DOLOR DE OÍDOS, DOLOR DE MUELAS

Consulte a su proveedor de servicios médicos con relación al tratamiento que el niño deberá recibir.

DOLOR DE GARGANTA

Llame a su proveedor de servicios médicos si su niño tiene uno o más de los siguientes síntomas:

- Fiebre de 100 grados o más
- Puntos amarillos o blancos en la garganta
- Sarpullido en el cuerpo
- Si de repente tiene la garganta extremadamente irritada o la garganta se ve de color rojo brillante.
- Glándulas inflamadas

RESFRIADOS

Llame a su proveedor de servicios médicos si su niño tiene:

- Secreciones que se tornan espesas y amarillas o verdes
- Si le da fiebre o dolor de oídos
- Si se empeora o dura más de siete a diez días enfermo/a.

SARPULLIDOS

No todos los sarpullidos son contagiosos; sin embargo, un sarpullido puede ser la primera señal de una de las muchas enfermedades de la niñez. El sarpullido puede que cubra el cuerpo entero o solo un área del cuerpo. No envíe a su niño a la escuela hasta que su proveedor de servicios médicos le diga que puede hacerlo.

PIOJOS

Cuando se descubre un caso activo de piojos en la cabeza, aplíquelo tratamiento inmediatamente y siga las instrucciones con mucho cuidado.

El paso más importante es revisar diariamente el cabello para ver si tienen liendres y sacarlas durante los siguientes 14 días.

SECRECIÓN DE LOS OJOS

Los ojos rojos con picazón y descarga acuosa clara pueden ser la causa de una reacción alérgica o una infección viral. Los ojos rojos con picazón y secreción amarillenta puede ser la causa de una infección viral o bacteriana y generalmente va acompañado con resfriado. Puede que le receten gotas de antibióticos para los ojos en el caso de una infección bacteriana. Si se le ha recetado gotas de antibióticos para los ojos, su niño podrá volver a la escuela después de haber recibido el tratamiento por 24 horas.